

Kupunguza hatari za vifo kwa watoto wagonjwa na wenye utapiamlo

Hatari ya kufa wakati na baada ya magonjwa ya utotoni kama vile kuhara, nimonia, maambukizo mengine na malaria ni kubwa katika nchi za kipato cha chini na cha kati. Mtandao wa Childhood Acute Illness & Nutrition ("CHAIN") unataka kuboresha malezi ya watoto na kuelewa mambo yanayoongeza uwezekano wao kufa. Utafiti wa CHAIN:

- Uliandikisha watoto wa umri wa miezi 2-23 waliokuwa wagonjwa waliolazwa katika hospitali tisa katika nchi nne za Afrika na mbili za Asia Kusini.
- Ulikusanya habari juu ya hali ya kliniki, lishe na hali ya jamii ya watoto.
- Ulifuatilia watoto wakati walipokuwa hospitalini na kwa miezi sita baada ya kutoka

Utafiti wa CHAIN Study ulifanikishwa na watoto na walezi wao kwa watoto na walezi wao ambao walishiriki Kwa hiari katika utafiti, Ushirikishaji na usaidizi kutoka kwa wanajamii na Wizara Za Afya za mitaa, na uongozi wa wafanyikazi wa afya na watafiti kutoka duniani kote.

MATOKEO YA UTAFITI WA CHAIN - ULIOELEKEZWA KWA JAMII

